

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 19-6-75054950

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, INDRE-ET-LOIRE, EURE-ET-LOIR)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, rue de Curambourg - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

Téléphone : 86-36-24

ABONNEMENT ANNUEL : 50 F

M. le Sous-Régisseur de recettes
de la Protection des Végétaux
93, RUE DE CURAMBOURG
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
C. C. P. : La Source 4604-25

BULLETIN TECHNIQUE N° 61

16 JUIN 1975

MILDIU DE LA VIGNE

VIGNES

Les premières taches de mildiou, en provenance de l'Indre et Loire, viennent de nous être envoyées dans le cadre du concours pour la détection des foyers primaires de mildiou. Elles sont encore très rares.

Le temps actuel instable, avec risques de pluies éparses, pourrait donc être à l'origine de contaminations sur les vignes n'ayant reçu jusqu'alors aucun traitement.

En conséquence, il est conseillé d'effectuer un premier traitement dès réception de ce bulletin, les vignes arrivant au stade très sensible de la floraison.

BLACK-ROT

Le traitement dirigé contre le mildiou de la vigne sera efficace contre le Black-Rot. Mais il est nécessaire de respecter les doses d'emploi qui ont été précisées contre cette maladie dans le numéro de Mars de la revue "PHYTOMA".

OIDIUM

Il est conseillé de profiter de la floraison pour effectuer un soufrage.

VERS DE LA GRAPPE

Les indications données dans notre bulletin du 10 Juin restent toujours valables. Il est nécessaire de surveiller les vignes afin d'effectuer un traitement dès que la présence de glomérules indique une activité de ces ravageurs.

POU DE SAN JOSE

ARBRES FRUITIERS

Les premières larves viennent d'être observées.

En conséquence, dans les zones contaminées et de protection, un premier traitement doit être appliqué dès réception de ce bulletin. Une nouvelle application devra être effectuée deux semaines après.

La pulvérisation devra être particulièrement soignée afin que le tronc et les branches soient bien couverts. On pourra utiliser un produit à base des matières actives suivantes : METHIDATHION (40 g/hl), OLEOPARATHIONS (25 g/hl), PARATHIONS EMULSION (30g/hl).

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES - TAVELURES - PSYLLES

Il y a lieu de tenir compte des indications données dans notre bulletin du 10 Juin.

ENNEMIS DES CEREALES

CULTURES CEREALIERES

Les attaques de PUCERONS se généralisent dans de nombreuses cultures céréalières.

Les manifestations de ROUILLE JAUNE sont parfois très nombreuses, notamment sur la variété JOSSE. Les attaques d'AGROMYZA sont très variables suivant les cultures.

Les bulletins n° 51, 53 et 55 ont fait le point sur ces problèmes. On considère actuellement que les pucerons ne font plus de dégâts dès que les grains sont arrivés au stade laiteux.

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements Agricoles

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la circonscription phytosanitaire CENTRE

G. RIBAUT
B. LELIEVRE

G. BENAS

P 380